

ايميلاكس سوبر 50% WP

تركيبة المبيد

: مبيد فطري يحتوي على 15% ميتالاكسيل + 35% كبر اوكسي كلورايد النحاس (و/و) على هيئة مسحوق قابل للبلل.

تأثير المبيد

: مبيد فطري جهازي ، له تأثير وقائي وعلاجي للقضاء على الامراض الفطرية.

خصائص المبيد

ايميلاكس سوبر 50%

مبيد فطري جهازي ، له تأثير وقائي وعلاجي ، للقضاء على طيف واسع من الامراض الفطرية مثل البياض الزغبي ، اعفان الجذور .

ايميلاكس سوبر 50%

مبيد يتكون من خليط مادتين فعاليتين من مجموعتين مختلفتين ليعطي فعالية عالية وقوه مضاعفة في مكافحة الفطريات .

ايميلاكس سوبر 50%

يستخدم على المحاصيل مثل العنب و الفستق .

ايميلاكس سوبر 50%

السمية على النبات ليس له اي تأثير سلبي على النبات بالنسب الموصى بها.

ايميلاكس سوبر 50%

ضار اذا ابتلع ، ضار اذا استنشق ، يسبب حساسية للعيون والجلد، سام للأحياء المائية ، متوسط السمية للنحل.

نسبة الاستخدام في الجدول التالي :

المحصول	المرض	معدل الاستخدام / 20 لتر ماء	فترة الامان	الفترة بين الرشاش	ملاحظات الاستخدام
العنب	البياض الزغبي	30 غرام	7 ايام	من 7 الى 21 يوم	بعد الازهار على فترات 7 - 21 يوم لا تستخدم اكثر من رشتين متتاليتين 4 رشاشات في الموسم كحد اقصى لا يستخدم فترة ازهار العنب
الفسق	الفيثوفثوريا ، اعفان الجذور	رش او سقيا 25 غرام / لتر حسب حجم الشجرة	28 يوم	من 7 الى 21 يوم	ازالة الاعشاب الضارة قبل الاستخدام يبدأ الاستخدام من أعلى الاشجار الى الاسفل وحول التربة لمسافة متر مربع للحصول على نتائج جيدة يجب دائما مكافحة الاعشاب الضارة

Phone Num: +962795550988 / +962775681444
P O Box: 20 / Postal code / Irbid 1467

Email: info@qasioun-vet.com
Website: WWW.Qsioun-vet.com