

بورونكس

- ❖ سمد يمد النبات بعنصري البورون والزنك ويعالج أعراض نقص البورون على مختلف المحاصيل .
- ❖ يعمل على زيادة فعالية حيوب اللقاح وقابلية المياسم لاستقبالها مما ينعكس أثره على زيادة العقد والنتاجية .
- ❖ تزيد من قدرة النبات على امتصاص العناصر الغذائية وتزيد من كفاءة التمثيل الضوئي كما تحفز النبات على تكوين البروتين .

تركيبة بورونكس :

| المادة | الرمز | النسبة | (وزن / حجم) |
|----------|-------|--------|---------------|
| بورون | B | 10% | وزن / حجم |
| زنك | Zn | 15% | وزن / حجم |
| مولبيدوم | Mo | 0.5% | وزن / حجم |

نسبة الاستخدام في الجدول التالي :

| المحصول | الاستعمال |
|----------------------------|---|
| الخضار المكشوفة | قبل بدء الزهار 75-100غم / 200 لتر ماء وتكرر عند تعاقب الاثمار مرة كل 3 اسابيع |
| الخضار المحمية | قبيل الازهار 20-75 غم / 200لتر ماء وتكرر مرة كل اسبوعين او 3 اسابيع |
| المحاصيل الحقلية | بعد التفريخ والاشطاء 1-1.5 كغم لكل فدان ولمرة واحدة |
| التفاحيات واللوزيات والعنب | قبيل تفتح الازهار 75-100 غم / 200لتر ماء وتكرر عند تعاقب الثمار مرة كل 3 اسابيع |

التعبئة : 1 كغم