



شركة قاسيون لتصنيع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م
QASIOUN CO. FOR MFG OF VET. & AGR MEDICINES L.L.C

كورنيت 24% EC

تركيبية المبيد

مبيد عشبي يحتوي على 24% اوكسيفلورفين و/ح على هيئة مركز قابل للاستحلاب .

تأثير المبيد

مبيد عشبي اختياري يعمل عن طريق الملامسة لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة ورفيعة الأوراق .

خصائص المبيد

مبيد عشبي اختياري يعمل باللامسة يمتص عن طريق الأجزاء الخضرية بشكل أسرع من امتصاصه عن طريق الجذور.

يعمل على مكافحة الأعشاب الحولية عريضة الأوراق والإعشاب رفيعة الأوراق قبل وبعد الإنبات .

عدم السماح بالرعي في الأراضي التي تم رش المبيد الاعشاب فيها .

نسبة الاستخدام في الجدول التالي :



شركة قاسيون لتصنيع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م
QASIOUN CO. FOR MFG OF VET. & AGR MEDICINES L.L.C

المحصول	الآفات المستهدفة	معدل الاستخدام /دونم	عدد مرات الرش	الفترة بين الرشات
التوت الأسود	الحد من البراعم الزائدة	375-190 مل	حتى 4 مرات	3 - 6 أسابيع
التوت الأحمر	الحد من البراعم الزائدة	350-88 مل	حتى 2 مرات	3 - 6 أسابيع
الفراولة	الحشائش عريضة الأوراق	118 مل	1مرة	150 يوماً قبل الحصاد
العنب (فترة السكون)	مكافحة الفروع الزائدة	236-118 مل	حتى 2 مرات	60 يوماً قبل الحصاد
البصل الجاف	الحشائش السنوية	263-118 مل	1مرة	48 ساعة
الثوم	الحشائش السنوية	236-100 مل	1مرة	60 يوماً قبل الحصاد
البقوليات الجافة	الحشائش الضارة	118-60 مل	1مرة	60 يوماً
النعناع	الحشائش عريضة الأوراق	710-470 مل	1مرة	مرة واحدة فقط
القمح والشعير	الحشائش عريضة الأوراق	236-190 مل	-----	10 أشهر
الفلفل	الحشائش السنوية	236-190 مل	-----	90 - 120 يوماً قبل الحصاد
الطماطم	الحشائش السنوية	236-190 مل	-----	60 - 120 يوماً قبل الحصاد
البطيخ والشمام	الحشائش السنوية	236-190 مل	-----	60 - 90 يوماً قبل الحصاد
الفول السوداني	الحشائش السنوية	236-118 مل	-----	60 يوماً قبل الحصاد
الزهرة الملفوف	الحشائش عريضة الأوراق	236-118 مل	-----	قبل الزراعة فقط
اشجار الفاكهة	الحشائش السنوية	470-236 مل	-----	3 - 6 أسابيع